

### 広島県 虚血性心疾患の脂質管理地域連携パス

虚血性心疾患の治療歴により  
生涯LDLコレステロール値は70mg/dl未満が目標

	LDL-C (mg/dl)		LDL-C (mg/dl)
退院時 ( / / )		2年後 ( / / )	
1ヶ月後 ( / / )		3年後 ( / / )	
3ヶ月後 ( / / )		4年後 ( / / )	
6ヶ月後 ( / / )		5年後 ( / / )	
9ヶ月後 ( / / )		6年後 ( / / )	
1年後 ( / / )		7年後 ( / / )	

血液検査 (1, 3, 6, 9, 12ヶ月後 以後年に1回)

入院 1ヶ月後 3, 6, 9, 12ヶ月後

虚血性心疾患  
ストロングスタチン開始

LDL-C 70mg/dl以上 → エゾロメチン 10mg追加 → 阿托莫、PCSK9阻害薬を導入 (病院で導入)

LDL-C 70mg/dl未満 → かかりつけ医でフォローアップ LDL-C70mg/dl以上に上昇した場合 脂質低下療法を強化 (必要に応じて病院へ紹介)

ストロングスタチン	標準	高用量	最大用量
アトルバスタチン	10mg	20mg	40mg*
ピタバスタチン	1mg	4mg	4mg
ロスバスタチン	5mg	10mg	20mg

PCSK9阻害薬	用法及び用量
インクリラン	1回300mgを初回、3ヶ月後、以降6ヶ月に1回 (施設注射)
エボロクマブ	140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回(原則自己注)

\*FHの場合40mgまで増量可能 広島大学病院脳卒中・心臓病等総合支援センター/広島県地域保健対策協議会

### 広島県 虚血性心疾患の脂質管理地域連携パス

虚血性心疾患の治療歴により  
生涯LDLコレステロール値は70mg/dl未満が目標

	LDL-C (mg/dl)		LDL-C (mg/dl)
退院時 ( / / )		2年後 ( / / )	
1ヶ月後 ( / / )		3年後 ( / / )	
3ヶ月後 ( / / )		4年後 ( / / )	
6ヶ月後 ( / / )		5年後 ( / / )	
9ヶ月後 ( / / )		6年後 ( / / )	
1年後 ( / / )		7年後 ( / / )	

血液検査 (1, 3, 6, 9, 12ヶ月後 以後年に1回)

入院 1ヶ月後 3, 6, 9, 12ヶ月後

虚血性心疾患  
ストロングスタチン開始

LDL-C 70mg/dl以上 → エゾロメチン 10mg追加 → 阿托莫、PCSK9阻害薬を導入 (病院で導入)

LDL-C 70mg/dl未満 → かかりつけ医でフォローアップ LDL-C70mg/dl以上に上昇した場合 脂質低下療法を強化 (必要に応じて病院へ紹介)

ストロングスタチン	標準	高用量	最大用量
アトルバスタチン	10mg	20mg	40mg*
ピタバスタチン	1mg	4mg	4mg
ロスバスタチン	5mg	10mg	20mg

PCSK9阻害薬	用法及び用量
インクリラン	1回300mgを初回、3ヶ月後、以降6ヶ月に1回 (施設注射)
エボロクマブ	140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回(原則自己注)

\*FHの場合40mgまで増量可能 広島大学病院脳卒中・心臓病等総合支援センター/広島県地域保健対策協議会

### 広島県 虚血性心疾患の脂質管理地域連携パス

虚血性心疾患の治療歴により  
生涯LDLコレステロール値は70mg/dl未満が目標

	LDL-C (mg/dl)		LDL-C (mg/dl)
退院時 ( / / )		2年後 ( / / )	
1ヶ月後 ( / / )		3年後 ( / / )	
3ヶ月後 ( / / )		4年後 ( / / )	
6ヶ月後 ( / / )		5年後 ( / / )	
9ヶ月後 ( / / )		6年後 ( / / )	
1年後 ( / / )		7年後 ( / / )	

血液検査 (1, 3, 6, 9, 12ヶ月後 以後年に1回)

入院 1ヶ月後 3, 6, 9, 12ヶ月後

虚血性心疾患  
ストロングスタチン開始

LDL-C 70mg/dl以上 → エゾロメチン 10mg追加 → 阿托莫、PCSK9阻害薬を導入 (病院で導入)

LDL-C 70mg/dl未満 → かかりつけ医でフォローアップ LDL-C70mg/dl以上に上昇した場合 脂質低下療法を強化 (必要に応じて病院へ紹介)

ストロングスタチン	標準	高用量	最大用量
アトルバスタチン	10mg	20mg	40mg*
ピタバスタチン	1mg	4mg	4mg
ロスバスタチン	5mg	10mg	20mg

PCSK9阻害薬	用法及び用量
インクリラン	1回300mgを初回、3ヶ月後、以降6ヶ月に1回 (施設注射)
エボロクマブ	140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回(原則自己注)

\*FHの場合40mgまで増量可能 広島大学病院脳卒中・心臓病等総合支援センター/広島県地域保健対策協議会

### 広島県 虚血性心疾患の脂質管理地域連携パス

虚血性心疾患の治療歴により  
生涯LDLコレステロール値は70mg/dl未満が目標

	LDL-C (mg/dl)		LDL-C (mg/dl)
退院時 ( / / )		2年後 ( / / )	
1ヶ月後 ( / / )		3年後 ( / / )	
3ヶ月後 ( / / )		4年後 ( / / )	
6ヶ月後 ( / / )		5年後 ( / / )	
9ヶ月後 ( / / )		6年後 ( / / )	
1年後 ( / / )		7年後 ( / / )	

血液検査 (1, 3, 6, 9, 12ヶ月後 以後年に1回)

入院 1ヶ月後 3, 6, 9, 12ヶ月後

虚血性心疾患  
ストロングスタチン開始

LDL-C 70mg/dl以上 → エゾロメチン 10mg追加 → 阿托莫、PCSK9阻害薬を導入 (病院で導入)

LDL-C 70mg/dl未満 → かかりつけ医でフォローアップ LDL-C70mg/dl以上に上昇した場合 脂質低下療法を強化 (必要に応じて病院へ紹介)

ストロングスタチン	標準	高用量	最大用量
アトルバスタチン	10mg	20mg	40mg*
ピタバスタチン	1mg	4mg	4mg
ロスバスタチン	5mg	10mg	20mg

PCSK9阻害薬	用法及び用量
インクリラン	1回300mgを初回、3ヶ月後、以降6ヶ月に1回 (施設注射)
エボロクマブ	140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回(原則自己注)

\*FHの場合40mgまで増量可能 広島大学病院脳卒中・心臓病等総合支援センター/広島県地域保健対策協議会